

Tabella valutazione invalidità permanente

(rif. Copertura infortuni)

Perdita anatomica e funzionale di:	
• un arto superiore	70%
• una mano o un avambraccio	60%
• un pollice	18%
• un indice	14%
• un medio	8%
• un anulare	8%
• un mignolo	12%
• una falange ungueale del pollice	9%
• una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito
• un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%
• un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
• un arto inferiore al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzio medio di gamba	50%
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	
• un occhio	25%
• ambedue gli occhi	100%
Perdita anatomica:	
• di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria	15%
• della milza senza compromissione significativa della crisi ematica	8%
Stenosi nasale assoluta:	
• monolaterale	4%
• bilaterale	10%
Anchilosi:	
• della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%
• del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%
• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%
• dell'anca in posizione favorevole	35%
• del ginocchio in estensione	25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
Blocco della prono-supinazione in semipronazione dell'avambraccio e della mano	7%
Paralisi completa del nervo	
• radiale	35%
• ulnare	20%
• sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo	

• di una vertebra cervicale	12%
• di una vertebra dorsale	5%
• della dodicesima dorsale	10%
• di una vertebra lombare	10%
Postumi di un trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione del movimento del capo e del collo	2%
Esiti di frattura:	
• del menisco laterale brachiale del ginocchio indipendentemente dal trattamento attuabile	3%
• del menisco mediale del ginocchio indipendentemente dal trattamento attuabile	2%
• di un metamero sacrale	3%
• di un metamero cocigeo con callo deforme e dolente	5%
Lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio	9%
Esiti di rottura sottocutanea:	
• del tendine di Achille	4%
• di un tendine del bicipite brachiale	5%
• di un qualsiasi altro tendine	2%
Sordità completa di:	
• un orecchio	10%
• ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%