

Gestione Professionisti

L'assistenza sanitaria integrativa PER TUTTI I PROFESSIONISTI




Tabella valutazione Invalidità Permanente 2026

TABELLA VALUTAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE (rif. COPERTURA INFORTUNI)

PERDITA ANATOMICA E FUNZIONALE DI	
un arto superiore	70 %
una mano o un avambraccio	60 %
un pollice	18 %
un indice	14 %
un medio	8 %
un anulare	8 %
un mignolo	12 %
una falange ungueale del pollice	9 %
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito
un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70 %
un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60 %
un arto inferiore al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
un piede	40 %
ambedue i piedi	100 %
Un alluce	5 %
Un altro dito del piede	1 %
La falange ungueale dell'alluce	2,5 %
un occhio	25 %
ambedue gli occhi	60 %

PERDITA ANATOMICA	
di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria	15 %
della milza senza compromissione significativa della crisi ematica	8 %

STENOSI NASALE ASSOLUTA	
monolaterale	4 %
bilaterale	10 %

SORDITÀ COMPLETA DI	
un orecchio	10 %
ambedue gli orecchi	40 %
Perdita della voce	30 %

ANCHILOSI

della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25 %
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20 %
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10 %
dell'anca in posizione favorevole	35 %
del ginocchio in estensione	25 %
della tibio-tarsica ad angolo retto	10 %
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15 %
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell'avambraccio e della mano	7 %

PARALISI COMPLETA DEL NERVO

radiale	35 %
ulnare	20 %
sciatico popliteo esterno	15 %
esiti di frattura scomposta di una costa	1 %

ESITI DI FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO

di una vertebra cervicale	12 %
di una vertebra dorsale	5 %
della dodicesima dorsale	10 %
di una vertebra dorsale	10 %
postumi di un trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione del movimento del capo e del collo	2 %

ESITI DI FRATTURA

del menisco laterale brachiale del ginocchio indipendentemente dal trattamento attuabile	3 %
del menisco mediale del ginocchio indipendentemente dal trattamento attuabile	2 %
di un metamero sacrale	3 %
di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente	5 %
lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio	9 %